

REPKA KOMPLET PACK


Exkluzívne

Balíček prípravkov Metaquin, Riza a Rapid určený na komplexné ošetrovanie 25 ha repky ozimnej.

Zloženie balíčka REPKA KOMPLET PACK				
Prípravok	Účinná látka	Dávka na 25 ha	Dávka na ha	Typ POR
Metaquin	333 g/l metazachlor 83 g/l quinmerac	50 l	2 l	herbicíd
Riza	250 g/l tebuconazole	15 l	0,6 l	insekticíd
Rapid	60 g/l gamma-cyhalothrin	2 l	0,14 l	fungicíd

Výhody použitia:

- komplexné balenie na ochranu repky (herbicíd + insekticíd + fungicíd)
- možnosť aplikácie v tank-mixe



Pôsobenie prípravku:

Metaquin

Postrekový prípravok vo forme tekutého dispergovateľného koncentráту na reguláciu jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín v horčici, repke ozimnej a jarnej.

Účinná látka sa do rastliny dostáva koreňmi pri vzhádzaní, po vzídení čiastočne aj listami. Pri aplikácii na pôdu pred vzídením burín spôsobuje uhynutie burín pred alebo krátko po vyklíčení (reguluje buriny až do fázy klíčnych listov). K hlavnej účinnosti dochádza cez pôdu, spoľahlivo pôsobí len pri dostatočnej pôdnej vlhkosťi (pri aplikácii za sucha sa účinok dostaví až po zrážkach). Účinok trvá podľa podmienok 4-6 mesiacov.

Riza

Účinná látka **tebuconazole**, patrí do chemickej skupiny triazoly. Pôsobí ako **systemový fungicíd** s formuláciou EW. Pre jesennú aplikáciu sa odporúča dávka 0,6 l/ha (min. 400 l vody), **reguluje čerň repkovú a bielu hnilobu**, pričom má **vedľajšiu účinnosť na fómovú hnilobu a významné morforegulačné pôsobenie**. Vhodný do tank-mixu aj s listovými hnojivami (RWA Bór 150) a stimulantmi rastu.

Rapid

Insekticíd s formuláciou CS s účinnou látkou **gamma-cyhalothrin**, patrí do chemickej skupiny pyretróidy. Pôsobí ako **dotykový a požerový jed s knockdown efektom**. Vyznačuje sa krátkou reziduálnou účinnosťou bez hĺbkového účinku. Pri postrekovej dávke 0,08 l/ha reguluje **blyskáčika jarného, byľomora kelového, krytnos repkový, štvorzubý a šešuľový, piliarka repková a skočky** s ochranou dobou 28 dní. Pri dávke 0,06 l/ha reguluje **vošku kapustovú** s rovnakou ochranou dobou. Pri aplikácii za vyšších teplôt (nad 23°C) je menej účinný. Vhodný do tank-mixu s graminicídmi, CCC a DAM 390.

Spektrum účinku	
Burinné spektrum	Účinnosť
Bolehlav škvrnitý	■ ■ ■
Hluchavka objímavá	■ ■ ■
Hluchavka purpurová	■ ■ ■
Hviezdica prostredná	■ ■ ■
Ježatka kuria	■ ■ ■
Láskavec ohnutý	■ ■ ■
Lipkavec obyčajný	■ ■ ■
Luľok čierny	■ ■ ■
Metlička obyčajná	■ ■ ■
Mlieč roľný	■ ■ ■
Mlieč zeliný	■ ■ ■
Mohár praslenatý	■ ■ ■
Mohár sivý	■ ■ ■
Parumanček nevoňavý	■ ■ ■
Psiarka roľná	■ ■ ■
Ruman roľný	■ ■ ■
Tetucha kozia	■ ■ ■
Veroniky	■ ■ ■
Žltica malouborová	■ ■ ■
Durman obyčajný	■ ■ (■)
Horčiak broskyňolistý	■ ■
Horčiak štiavolistý	■ ■
Konopnica napuchnutá	■ ■
Mak vlčí	■ ■
Nevädza poľná	■ ■
Ovos hluchý	■ ■
Pohánkovec ovjávavý	■ ■
Úhorník liečivý	■ ■
Kapsička pastierska	■ (■)
Mrlík biely	■ (■)
Mrlík hybridný	■ (■)
Fialka roľná	■
Loboda konaristá	■
Peniažtek roľný	■
Red'kev ohnicová	■
Stavikrv vtáčí	■
Zemedym lekársky	■

Vysvetlivky, účinnosť:



výborná
veľmi dobrá
dobrá